下線部：
2026年10月改訂

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください．
また，必要なときに読めるよう大切に保存してください．

第2類
医薬品

漢方薬

オオクサ 葛根湯エキス顆粒EX

特　　徴

○漢方薬「葛根湯」（かっこんとう）は，最も一般的な漢方薬で，かぜによる悪寒，発熱，鼻水，ふしぶしの痛みなどに広く用いられます．
○肩こりや，首筋・背中のこわばり，頭痛にも良く効きます．
○眠くなりにくいので，仕事中や外出先で安心して服用になれます．

⚠ 使用上の注意

相談すること

1．次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

（1）医師の治療を受けている人．
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人．
（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人，体の弱い人）．
（4）胃腸の弱い人．
（5）発汗傾向の著しい人．
（6）高齢者．
（7）今までに薬などにより発疹・発赤，かゆみ等を起こしたことがある人．
（8）次の症状のある人．
　むくみ，排尿困難
（9）次の診断を受けた人．
　高血圧，心臓病，腎臓病，甲状腺機能障害

2．服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　　状
皮　　膚	発疹・発赤，かゆみ
消　化　器	吐き気，食欲不振，胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります．その場合は直ちに医師の診療を受けてください．

症状の名称	症　　状
偽アルドステロン症，ミオパチー	手足のだるさ，しびれ，つっぱり感やこわばりに加えて，脱力感，筋肉痛があらわれ，徐々に強くなる．
肝機能障害	発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる．
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる，水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる，高熱，のどの痛み等が持続したり，急激に悪化する．

3．1ヵ月位（感冒の初期，鼻かぜ，頭痛に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

4．長期連用する場合には，医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

効　　能


感冒


肩こり

体力中等度以上のものの次の諸症：
感冒の初期（汗をかいていないもの），鼻かぜ，鼻炎，頭痛，肩こり，筋肉痛，手や肩の痛み

用法・用量

次の量を，食前又は食間に，水又は白湯で服用してください．
※食前とは食事の30分位前，食間とは食後２～３時間のことです．

年　　齢	１回量	１日服用回数
成人（15 歳以上）	１包	３回
15 歳未満 7 歳以上	2/3包	
7 歳未満 4 歳以上	1/2包	
4 歳未満 2 歳以上	1/3包	
2 歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞
（1）小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください．

成分・分量

成人の１日服用量３包（6.0ｇ）中，次の成分及び分量からなる葛根湯エキス（3/4量）3233㎎を含んでいます．

成　　分	分　　量
カッコン（葛根）	6.00ｇ
マオウ（麻黄）	3.00ｇ
タイソウ（大棗）	3.00ｇ
ケイヒ（桂皮）	2.25ｇ
シャクヤク（芍薬）	2.25ｇ
カンゾウ（甘草）	1.50ｇ
ショウキョウ（生姜）	0.75ｇ

添加物として乳糖，セルロース，ステアリン酸Mg，無水ケイ酸を含有します．

保管及び取扱い上の注意



（1）直射日光の当たらない，湿気の少ない涼しい所に保管してください．
（2）小児の手の届かない所に保管してください．
（3）他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）．
（4）１包を分割した残りを使用する場合には，分包の口を折り返して保管し，２日以内に使用してください．

その他の注意

（1）天然原料を用いていますので，色調・匂いが製品により多少異なることがありますが，効果に変わりはありません．

包　　装

9包　18包

本製品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます．
日邦薬品工業株式会社　お客様相談室
03(3370)7174㈹（9：00～17：00　土･日･祝日を除く）

発売元　日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元　大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎１-17-15