下線部：
2026年10月改訂

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください．
また，必要なときに読めるよう大切に保存してください．

第2類
医薬品

かぜ薬
カゼコール®

特　　徴

○カゼコールは，葛根湯（かっこんとう）に生薬解熱剤である地竜（じりゅう）エキスを配合した独自の処方で，かぜの初期にあらわれる頭痛，悪寒，発熱，関節痛などの症状に効果を発揮します．
○眠くなりにくいので，仕事中や外出先でも安心して服用になれます．

⚠使用上の注意

相談すること

1．次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人．
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人．
（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人，体の弱い人）．
（4）胃腸の弱い人．
（5）発汗傾向の著しい人．
（6）高齢者．
（7）今までに薬などにより発疹･発赤，かゆみ等を起こしたことがある人．
（8）次の症状のある人．　むくみ，排尿困難
（9）次の診断を受けた人．　高血圧，心臓病，腎臓病，甲状腺機能障害

2．服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤，かゆみ
消化器	吐き気，食欲不振，胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります．その場合は直ちに医師の診療を受けてください．

症状の名称	症状
偽アルドステロン症，ミオパチー	手足のだるさ，しびれ，つっぱり感やこわばりに加えて，脱力感，筋肉痛があらわれ，徐々に強くなる．
肝機能障害	発熱，かゆみ，発疹，黄疸（皮膚や白目が黄色くなる），褐色尿，全身のだるさ，食欲不振等があらわれる．
多形紅斑	皮膚が広い範囲で赤くなる，水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる，高熱，のどの痛み等が持続したり，急激に悪化する．

3．1ヵ月位（かぜの初期に服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
4．長期連用する場合には，医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

効　　能

胃腸の比較的丈夫な人のかぜの初期症状（悪寒，発熱，頭痛，関節痛，筋肉痛，鼻水，鼻づまり，咽頭痛）



用法・用量

次の量を食前又は食間に，水またはお湯で服用してください．

年　齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
7歳以上15歳未満	2/3包	
7歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させてください．

成分・分量


成人の1日服用量3包（6.9ｇ）中，次の成分を含んでいます．

成　分	含　量
葛根湯エキス	5600mg
カッコン（葛根）	5.33g
マオウ（麻黄）	2.67g
タイソウ（大棗）	2.67g
ケイヒ（桂皮）	2.00g
シャクヤク（芍薬）	2.00g
カンゾウ（甘草）	1.33g
ショウキョウ（生姜）	0.67g
地竜エキス散-N（原生薬　地竜として1.40g）	700mg

添加物として乳糖，部分アルファー化デンプン，サッカリンNa，セルロース，メタケイ酸アルミン酸Mg，無水ケイ酸を含有します．

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない，湿気の少ない涼しい所に保管してください．
(2) 小児の手の届かない所に保管してください．
(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変化します）．
(4) 1包を分割した残りを使用する場合には，分包の口を折り返して保管し，2日以内に使用してください．



その他の注意

(1) 天然原料を用いていますので，色調・匂いが製品により多少異なることがありますが，効果に変わりはありません．

包　装

10包　16包　24包

本製品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます．

日邦薬品工業株式会社　お客様相談室

03(3370)7174(代)（9:00～17:00　土･日･祝日を除く）

発売元　日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元　大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15