

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第3類
医薬品

胃 腸 薬
お お く さ い ち ょ う さ ん
大草胃腸散
お お く さ い ち ょ う さ ん

大草胃腸散 (分包)

特 徴

- 大草胃腸散及び大草胃腸散(分包)は、健胃作用のある生薬を主とし、消化を助ける牛胆汁エキス末、さらに胃酸中和作用をもつ成分を配合した胃腸薬です。
- 胃がもたれて膨満感のある方、胸やけがしたり、胃痛や胃弱でお悩みの方によく効きます。
- 二日酔や消化不良、飲み過ぎ・食べ過ぎ、食欲不振のときにも効果的です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

- もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感、胃部不快感、胃重
- 食欲不振(食欲減退)、飲み過ぎ、食べ過ぎ、げっぷ(おくび)、消化不良
- 胃痛、胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、胃弱
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐



もたれ



飲み過ぎ、食べ過ぎ




胃のむかつき

用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。
缶入製品を服用の際には、添付の匙さしをご使用ください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1.5 g (1 包)	3回
11 歳以上15 歳未満	1.0 g (2/3包)	
8 歳以上11 歳未満	0.75g (1/2包)	
5 歳以上 8 歳未満	0.5 g (1/3包)	
5 歳未満	服用しないでください	

匙の使用法



＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

成人の 1 日服用量 3 包 (4.5g) 中

成 分	含 量	作 用
オ ウ バ ク 末(黄柏末)	800 mg	苦味健胃作用により消化を助け、食欲を高めます。
オ ウ レ ン 末(黄連末)	100 mg	
ケ イ ヒ 末(桂皮末)	240 mg	芳香性健胃作用とともに胃痛を緩和します。
チ ョ ウ ジ 末(丁子末)	50 mg	芳香性健胃作用とともに吐き気を抑えます。
ショウキョウ末(生姜末)	100 mg	
ウ イ キ ョ ウ 末(茴香末)	100 mg	胃腸の動きを活発にし、膨満感を解消します。
キ ジ ツ 末(枳実末)	300 mg	胃のつかえをとり、膨満感を解消します。
ボ レ イ 末(牡蛎末)	700 mg	胃酸を中和し、胃痛を緩和します。
牛 胆 汁 エ キ ス 末	125 mg	脂肪の消化を助けます。
沈 降 炭 酸 カ ル シ ウ ム	995 mg	胃酸を中和します。
ケ イ 酸 マ グ ネ シ ウ ム	400 mg	

添加物として l-メントール、バレイシヨデンプンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1 包を分割した残リを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2 日以内に使用してください。
- (5) 缶入製品は、独特の香気がいづまでも保たれるように、使用後は容器の蓋をしっかりと閉じておいてください。



包 装

190g 380g 30包 54包 92包

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 03(3370)7174(代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15