

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類
医薬品

漢方薬
オオクサ八味丸
オオクサ八味丸 (分包)

特 徴

- 漢方薬「八味地黄丸」(はちみじおうがん)は、中高年の方の体力の衰えや、老化による腰痛、残尿感、夜間頻尿、軽い尿漏れなどによく効きます。
- オオクサ八味丸は、「八味地黄丸」の処方に基づき8種類の生薬末をハチミツで練り合わせた丸剤で、独特な香味を持ち、大変のみやすくなっています。
- 高血圧に伴う肩こり、頭重、耳鳴りにも適しています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位		症 状
皮 膚		発疹・発赤、かゆみ
消 化 器		食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他		動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ



足腰のしびれ



かすみ目



排尿困難

用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	20丸(1包)	3回
7歳以上15歳未満	14丸(約2/3包)	
7歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量


成人の1日服用量60丸(3包)中

成 分	含 量
ジ オ ウ (地 黄)	1600 mg
サンシュユ (山茱萸)	800 mg
サンヤク (山 薬)	800 mg
タクシャ (沢 瀉)	600 mg
ブクリョウ (茯 苓)	600 mg
ポタンピ (牡丹皮)	600 mg
ケイヒ (桂 皮)	200 mg
ブシ末 (附子末)	200 mg

添加物として寒梅粉、ハチミツ、セラックを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



包 装 1200丸、5000丸

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 03(3370)7174(代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元



日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15